

尊敬的客户，请仔细阅读本药品说明书，其中包含重要的信息。



Natrium Citricum 3,13%

- 成份：** 100 ml 药剂含有
- 3.13 g 二水柠檬酸钠相当于注射时用 2.79 g 柠檬酸钠配制的水溶液，即 3.13 % Ph. Eur. 和 3.8 % Erg.-B6 (可溶度)。
- 不含防腐剂。
- 用途：** 防止在 Ozon (臭氧)、HOT (凝固热) 和 UVB 自体血疗法中血液凝固。用于安全而高效的针对导管阻塞的透析。防止血液凝固，用于诊断目的，包括体外诊断。安瓿仅适用于一次性使用。
- 重复使用安瓿存在患病或感染操作人员的风险。受到污染的产品可能会导致患者受伤、患病或死亡。
- 回收多次使用会影响医药品的完整性。
- 提示：** 产品渗透压约为 290 - 300 mosmol/l (渗摩/升)。务必保持所需的渗透压范围。务必排除对血细胞和人体的危害。无菌且不含内毒素的溶液。
- 在穿刺前，先除去注射瓶组合盖，然后用合适的酒精类消毒剂消毒瓶塞。将大拇指放在预定断裂的瓶颈位置上，向侧面折断安瓿瓶颈，以此方法正确地打开安瓿。避免扎伤。
- 仅使用溶剂清澈、容器完好无损，而且尚未过期的溶液。切勿使用部分破裂的安瓿，注射瓶打开后需在 2°C - 8°C 条件下冷藏。
- 除以上情况外，则将容器存放在室温下的 (约 15°C - 25°C) 避光区域。切勿让儿童接触到药剂。
- 剂量较少时不会对环境造成危害，可以与生活垃圾一起废弃处理。溶液仅用于各种治疗法的使用说明中所规定的用途。
- 包装大小：**
- | | |
|------------|---------|
| 10 ml 安瓿 | 10 瓶/盒 |
| 10 ml 安瓿 | 100 瓶/盒 |
| 100 ml 注射瓶 | 20 瓶/盒 |

信息版本： 2024 年 1 月